

COMENTARIOS

Mortalidad General

La tasa de mortalidad general en el 2008 fue de 4.5 muertes por cada 1,000 habitantes, pero en términos absolutos hubo un ligero aumento en relación con el año anterior, de 14,775 a 15,115 defunciones. El 58.7 por ciento de estas defunciones ocurrieron en hombres.

Las provincias donde se registraron las tasas de mortalidad más altas son: Los Santos con el 6.7, la comarca Kuna Yala con 6.3 y Colón con 5.4, mientras que las más bajas, se dieron Comarca Emberá y Darién con 1.9 y 2.8 respectivamente, muy por debajo de la tasa nacional que fue de 4.5.

Mortalidad Infantil

Para este año se registraron 877 defunciones de menores de un año, lo que representa una tasa de 12.8 muertes por cada mil nacidos vivos. El 53.2 por ciento de estas defunciones corresponden a muertes neonatales (menores de 28 días) y el 46.8 por ciento restante, a defunciones post-neonatales (28 días a 11 meses).

Las tasas de mortalidad infantil más altas se registraron en Bocas del Toro con 32.6 por 1,000 nacimientos vivos; seguidas de las Comarcas Ngöbe Buglé con 17.6 y Kuna Yala con 16.3 y Chiriquí con 13.7. Mientras que los valores inferiores al de la República, los encontramos en las provincias de Coclé con 11.1, Panamá con el 10.1, Veraguas con 9.8, Los Santos con 8.4 y la Comarca Emberá con 5.4.

Las principales causas de muerte fueron "Ciertas afecciones originadas en el período perinatal", con 33.8 por ciento, seguida de las "Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas" con 27.1 por ciento y en tercer lugar la Neumonía con el 10.6 por ciento.

Mortalidad Materna

Las muertes maternas reportadas para el 2008 fueron 41, lo que se traduce en una tasa de 0.6 por cada mil nacimientos vivos y que refleja un ligero aumento, en comparación con los 40 casos informados en el 2007.

La Comarca Ngöbe Buglé con una tasa de 2.3 y la Comarca Kuna Yala con 3.3, fueron las regiones que presentaron mayores tasas de mortalidad.

Mortalidad por causa de muerte

Considerando la causa básica de la defunción, se puede indicar que las cinco principales causas de muerte en la República son: los "Tumores (neoplasias) malignos" en primer lugar con una tasa de 74.0 por cada 100,000 habitantes; con el 54.1, los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia" en segundo lugar; en tercer lugar con el 44.5, las "Enfermedades isquémicas del corazón"; seguido encontramos las "Enfermedades cerebrovasculares" en el cuarto lugar con el 40.3 y en la quinta posición está la "Diabetes mellitus" con una tasa del 26.1.

En el grupo de 1 a 4 años, la principal causa de muerte es la "Desnutrición" seguida de los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia"; de 5 a 14 años los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia"; los "Tumores (neoplasias) malignos" y "Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas" en el orden respectivo.

Respecto a las defunciones del grupo de 15 a 44 años, predomina en primera posición los "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia", seguida de la "Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)". En ambas causas se ven afectados primordialmente los hombres. La tercera causa de muerte en este grupo de edad, son los "Tumores (neoplasias) malignos", presentan una distribución diferente: las mujeres muestran un porcentaje ligeramente mayor al reflejado en las dos primeras causas.

Para el rango de 45 a 64 años, el primer lugar lo ocupan los "Tumores (neoplasias) malignos", con una diferencia entre hombres y mujeres de 48.5 y 51.5 por ciento, respectivamente. Como segunda causa de muerte, aparece "Accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otra violencia", donde los hombres aportan el 84.5 por ciento de las muertes en este grupo de edad.

Finalmente, en el grupo de 65 y más años de edad, tenemos los "Tumores (neoplasias) malignos", en la primera posición, aportando los hombres el 59.4 por ciento, en tanto que las "Enfermedades isquémicas del corazón" comienzan a presentarse con mayor fuerza en este grupo y ocupan la segunda posición, con una diferencia entre hombres y mujeres de 54.2 y 45.8 por ciento, respectivamente. En tercer lugar se ubican las "Enfermedades cerebrovasculares".